

# Ringen en Galoistheorie, Herkansing 5 juli 2017

Bij dit tentamen mag het dictaat niet gebruikt worden.  
Laat bij elke opgave zien hoe je aan je antwoord komt!!  
Veel succes!

## OPGAVEN

1. Stel  $P(X) = X^4 + 6X + 3$ .
  - (a) (1/2 pt) Ontbindt  $P(X)$  in irreducibele factoren in  $\mathbb{Q}[X]$ .
  - (b) (1/2 pt) Ontbindt  $P(X)$  in irreducibele factoren in  $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})[X]$ .
  - (c) (1/2 pt) Bewijs voor elke  $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  dat het polynoom  $X^n + Y^m - 1$  irreducibel is in  $\mathbb{C}[X, Y]$ .
  - (d) (1/2 pt) Bewijs dat  $\mathbb{Q}[X]/(X^3 + X^2 + 2)$  een lichaam is.
2. Zij  $R$  een domein en  $f \in R[X]$  een monisch polynoom van graad 2. We willen bewijzen dat  $R[X]/(f(X)) \cong R \times R$  precies dan als er verschillende  $a, b \in R$  bestaan, zó dat  $f(X) = (X - a)(X - b)$  en  $a - b \in R^\times$ .

Eerst nemen we aan dat  $a, b \in R$  en  $a - b$  een éénheid is in  $R$ .

  - (a) (1/2 pt) Bewijs dat  $(X - a, X - b) = (1) = R[X]$ .
  - (b) (1 pt) Kies  $f(X) = (X - a)(X - b)$ . Bewijs dat  $R[X]/(f) \cong R \times R$ .

Nu nemen we aan dat  $f \in R[X]$  een monisch polynoom is zó dat er een isomorfisme  $\phi : R[X]/(f) \rightarrow R \times R$  bestaat.

  - (c) (1/2 pt) Stel  $\phi(X) = (a, b) \in R \times R$ . Bewijs dat  $f(a) = f(b) = 0$ .
  - (d) (1 pt) De afbeelding  $\phi$  is surjectief. Dus bestaat er  $p(X) \in R[X]$  zó dat  $\phi(p(X)) = (1, 0)$ . Bewijs dat  $p(a) = 1, p(b) = 0$  en laat zien dat hieruit volgt dat  $a - b \in R^\times$ .
3. Beschouw de ring  $R$  bestaande uit de rationale getallen met oneven noemer.
  - (c) (1/2 pt) Bepaal de éénheden in  $R$ .
  - (d) (1/2 pt) Bepaal de irreducibele elementen in  $R$ .
  - (e) (1/2 pt) Bepaal de maximale idealen in  $R$ .
  - (f) (1/2 pt) Bewijs dat  $R$  een hoofdideaalring is.

Z.O.Z.

4. Beschouw het polynoom  $f = X^6 - 2tX^3 + 1 \in \mathbb{Q}(t)[X]$  in de variabelen  $X, t$  en zij  $L$  het splijtlichaam van  $f$  over het grondlichaam  $\mathbb{Q}(t)$ .
- (a) (1/2 pt) Bewijs dat  $f$  irreducibel in  $\mathbb{Q}(t)[X]$  is.
  - (b) (1/2 pt) Stel dat  $\alpha \in L$  een nulpunt is van  $f$ , dat wil zeggen:  $\alpha^6 - 2t\alpha^3 + 1 = 0$ . Laat zien dat  $\omega\alpha$  en  $1/\alpha$  ook nulpunten van  $f$  zijn (hierin is  $\omega^3 = 1, \omega \neq 1$ ).
  - (c) (1/2 pt) Bewijs dat  $L = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ .
  - (d) (1/2 pt) Je mag aannemen dat  $\omega \notin \mathbb{Q}(\alpha)$ . Bewijs dat  $[L : \mathbb{Q}(t)] = 12$ .
  - (e) (1 pt) Noem  $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q}(t))$ . Geef expliciet een element van orde 6 aan in  $G$ . Bepaal vervolgens  $G$ .